



Augenarztpraxis AltenKirchen
Dr. med. Thomas Wehler
Facharzt für Augenheilkunde
Wilhelmstr. 32
Schlossweg 2
57610 Altenkirchen
Tel 02681 - 1651
Fax 02681 - 6094
Mail info@ak-augenarzt.de
Net www.ak-augenarzt.de

ACHTUNG !!!

Geplante Operation – Blutverdünnende Mittel und andere Medikamente

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,
wir haben bei Ihnen eine Operation geplant.

Um das Risiko dieser Operation möglichst niedrig zu halten und die Sicherheit für Sie zu erhöhen, ist es unbedingt erforderlich, dass Sie nachfolgende Anweisungen befolgen:

Bei einer Einstellung auf **Marcumar** sollte der Quickwert am OP-Tag mindestens **40%** betragen oder der **INR kleiner 1,8** sein.

Sollten Sie nicht sicher sein, ob die von Ihnen eingenommenen Medikamente auch blutverdünnend wirken oder ob Sie diese absetzen können, so scheuen Sie sich bitte nicht, uns anzusprechen, anzurufen oder eine E-Mail zu senden. Sie können bei Fragen auch gerne Kontakt zu unserem Narkosearzt Herr Dr. Ansari aufnehmen, die mobile Telefonnummer lautet 0177-2760157.

Xarelto, Paradaxa, Eliquis oder Lixiana bitte 24 Stunden vor der Operation absetzen.

Alle anderen, hier nicht genannten, Blutverdünner können Sie wie gewohnt einnehmen.

Fragen Sie in diesem Zusammenhang auch bitte Ihren Hausarzt, Internisten oder Kardiologen.

Bitte auch **keine Blutzuckermedikamente am OP-Tag zuführen**. Bringen Sie bitte Ihre Insulinspritze oder die Blutzuckertabletten am Operationstag mit in die Praxis.

Bitte über einen Zeitraum von möglichst mindestens vier Wochen vor der Operation (in Absprache mit Ihrem Hausarzt/Urologen) die Medikamente

Tamsulosin, Alfuzosin, Doxazosin, Terazosin oder Silodosin

nicht einnehmen. Es handelt sich dabei um Substanzen zur Behandlung der **Prostata** oder **Blasenschwäche**.

Bitte, wenn möglich, **Risperidon** und **Paliperidon** (Antipsychotika) absetzen.

Bei Unklarheiten fragen Sie Ihren behandelten Arzt, ob er einem Absetzen der jeweiligen Medikamente zustimmt.